Akominato

Vass7R09s311-315

dinaminalinationalinational



Science S upper Collection Vassal-Montpellier

1809Mtp1

the spaningly rain

Akominato n 7 Rg s 311. 315









ANNEE 1989 Ahominato moir NOM 1809 01

EMPLACEMENT 7 B9 5311-315

dontonleatendarianleatend

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb		Ferti- lité	Flo début	oraiso mi/f			raisor mi/v		Maturité
	4	43 3	973 "	2								0 = 9
2 %	ч	133	22 3 1	2	5,0	29.5	2.6	5,6	21.8	28,8	4.9	25,9
4 f												
Por	urritu	re: 0	Mi 3, 89 +	.11. :	we	Port	: mi	engé	Vi	gueur	: 45	

ANNEE 1990 Akominiato n

7 R90-3111315 ... EMPLACEMENT

180901

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb			Flo début	oraisc mi/f		Vé début	raison mi/v		Maturité
1	4	15.3	19.3.	3								
3	4	15.3	19.3.	1	5	25,5	28.5	31.5	6,8	13.8	17,8	19990
5)	7 -	) le 13.	3.90	(410)			T.					
Pourriture: Mill.: Port: euge Vigueur: 3												
d'artine magnèsse												

NOM Akonulato n EMPLACEMENT 7 kg 9 1 3 M. 315

Souche Nore yeux début mi/déb grap lité début mi/f fin début mi/v fin Maturité

1 4 18,3 26,3 9 4 10,6 136 136 136 126 13 8 26,8 26,8 25,8 2 9
2 5 21,3 29.3 9 415 44 +6

3 4 21.3 29.3 9 Grappe: (G. M. - P. Dim.: // 8 Compacité: (L. - M. - C. Pour: O. Mill: 4
5 2 18,5 21,3 0 Baie: TC - (G. - M. - P. Dim.: 23 × 10 disc-sph-611-ov-obov-cyl-fus

Couleur: B-CR-RS-Rg-N Jus: (Inc. - coloré

Saveur: 6 n. - ar - fox - herb

Pépins: avec - apyrène

Port: 1 en 4 Vigueur: 2

United metrodomical metrodomica

Aleoninato noin 7 R9 1,311-315 (1.1) N° d'ordre : Désignation :

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 1/82 - moyen 183 - globuleux 184.

lundandanda

Emplacement :

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 166 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

dantadanjadantadantad

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures: glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 200 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 203 light le duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

#### Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 2(34) - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Palvo 88

N° d'ordre :

Unnimplemente

Désignation : Emplacement : Akominato noin 7R9s-311-3156.4

douton horten horten horten

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé. Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250. ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

: dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256. Noeuds ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

: verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

: coloré 26 vert 265.

#### (I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

-Calvoss

N° d'ordre : Désignation :

Lundon lundo

Emplacement :

Akominato moin FR 9 s. 311-315 (6.1)

# FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 aranéeux 147 duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

limbe: glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162) - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

Calvo88

N° d'ordre: Akominato non

Désignation: 7R9 s. 311-315 s. 1

Emplacement:

luntum mutu

#### GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 14 x ).

Lâche 1 - Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 6.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions :22 x 20). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91) Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105 - coloré 106. A ombilic très apparent - peu apparent. A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111. A saveur neutre 1(12) - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation façile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121. A pédicelle de couleur : verte 122) - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 - peu apparent 129. A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré 134. A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137. A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse. Avec pépins - apyrène.

Calvo 89

Akominato mon 7 R 90-311-315 s. 1

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

dadadadadadadadadadadad

### SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2) Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4). : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
 massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) duveteux (8) - cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : .......... cms. : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4). : plus foncé ( de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2) : saillant (1) - efface(2) : sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre: 1809-01 Désignation: Akominato M Emplacement: 4 R9 1 311-315

Junton motor

Angle des nervures Sexe : 7-8-9  $L_1/L_2$ : (10) - 11 L2/L : (10) - 11 Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - 15 - 16 Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - 20 Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - 23 - 24 Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29L2/L Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266 : 267 Sinus pétiolaire ouvert Dent au fond du sinus pétiolaire : (30) Forme sinus latéral Sup. 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : (269) - autre : 270 Sinus latéral Supérieur ouvert : 271 : 40 - 41 Dents : forme : 42 - 43 - 44 Dents (angle) : (45) - (46) - 47 Angle du lobe terminal Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - (49) - 50 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58- 59 Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : 60 - 61 - 62Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Reimes 30